

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	グリホサートを含む農薬の総使用回数
				薬量	希釈水量			
果樹類 (かんきつを除く)		一年生雑草		200～500 ml/10a	通常散布 50～100 L/10a 少量散布 25～50 L/10a	3回以内		3回以内
		多年生雑草		500～1000 ml/10a				
		スギナ		1500～2000 ml/10a				
		マルバツユクサ		500～1500 ml/10a				
かんきつ		一年生雑草	収穫7日前まで (雑草生育期)	200～500 ml/10a	通常散布 50～100 L/10a 少量散布 5～50 L/10a	5回以内		5回以内
		多年生雑草		500～1000 ml/10a				
		スギナ		1500～2000 ml/10a				
		マルバツユクサ		500～1500 ml/10a				
びわ(葉)	—	一年生雑草	耕起前まで (雑草生育期)	200～500 ml/10a	通常散布 50～100 L/10a 少量散布 5～50 L/10a	1回	雑草 茎葉散布	3回以内
		多年生雑草		500～1000 ml/10a				
		スギナ	収穫7日前まで (雑草生育期)	1500～2000 ml/10a	通常散布 50～100 L/10a 少量散布 25～50 L/10a	3回以内		
		マルバツユクサ		500～1500 ml/10a				
オリーブ (葉)		一年生雑草	耕起前まで (雑草生育期)	200～500 ml/10a	通常散布 50～100 L/10a 少量散布 5～50 L/10a	1回		3回以内
		多年生雑草		500～1000 ml/10a				
		スギナ	収穫21日前まで (雑草生育期)	1500 ml/10a	通常散布 50～100 L/10a 少量散布 25～50 L/10a	3回以内		
		マルバツユクサ		500～1500 ml/10a				

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	グリホサートを含む農薬の総使用回数
				薬量	希釈水量			
水田作物 (水田畦畔)	水田畦畔	一年生及び 多年生雑草	収穫前日まで (雑草生育期)	200～1000 mL/10a	少量散布 5～25 L/10a	3回以内		3回以内
		一年生雑草		200～500 mL/10a	通常散布 50～100 L/10a			
		多年生雑草		200～1000 mL/10a	少量散布 25～50 L/10a			
		スギナ		1500～2000 mL/10a	少量散布 25～50 L/10a			
水田作物 (水田刈跡)	水田刈跡	一年生雑草	雑草生育期	200～500 ml/10a	通常散布 50～100 L/10a	1回		1回
		多年生雑草		500～1000 ml/10a	少量散布 5～50 L/10a			
水田作物、 畑作物 (休耕田)	休耕田	一年生雑草	雑草生育期	200～500 mL/10a	通常散布 50～100 L/10a	3回以内	雑草 茎葉散布	3回以内
		多年生雑草		500～1000 mL/10a	少量散布 5～50 L/10a			
		スギナ		1500～2000 mL/10a	通常散布 50～100 L/10a 少量散布 25～50 L/10a			
水田作物 (水稻を除く) 移植水稻	—	一年生雑草及び 多年生広葉雑 草	耕起前 (雑草生育期)	200～500 mL/10a	通常散布 50～100 L/10a 少量散布 5～50 L/10a	2回以内		2回以内
		多年生イネ科 雑草		500 mL/10a	少量散布 5～25 L/10a			
				200～500 mL/10a	通常散布 50～100 L/10a 少量散布 25～50 L/10a			

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	グリホサートを含む農薬の総使用回数	
				薬量	希釈水量				
直播水稻	—	一年生雑草及び多年生広葉雑草	耕起前 (雑草生育期)	200～500 mL/10a	通常散布 50～100 L/10a 少量散布 5～50 L/10a	2回以内		2回以内	
		多年生イネ科雑草			500 mL/10a				少量散布 5～25 L/10a
		一年生及び多年生雑草	耕起直後～出芽前 (雑草生育期) (乾田耕起栽培)	200～500 mL/10a	通常散布 50～100 L/10a 少量散布 25～50 L/10a				少量散布 25～50 L/10a
			は種30日前～出芽前 (雑草生育期) (乾田不耕起栽培)						
麦類	—	一年生雑草	耕起前又はは種前まで (雑草生育期)	200～500 mL/10a	少量散布 5～25 L/10a	3回以内	雑草 茎葉散布	3回以内	
		一年生雑草及び多年生イネ科雑草	は種後出芽前 (雑草生育期)		通常散布 50～100 L/10a 少量散布 25～50 L/10a				
			耕起前又はは種前まで (雑草生育期)		通常散布 50～100 L/10a 少量散布 5～50 L/10a				
	圃場内の周縁部	一年生雑草	収穫前日まで (雑草生育期)	通常散布 50～100 L/10a 少量散布 5～50 L/10a					
雑穀類 (そば、とうもろこしを除く)	—	—	耕起前又はは種前まで (雑草生育期)	200～500 mL/10a	通常散布 50～100 L/10a 少量散布 25～50 L/10a	2回以内		2回以内	

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	グリホサートを含む農薬の総使用回数	
				薬量	希釈水量				
そば		一年生雑草	耕起前又はは種前まで (雑草生育期)		通常散布 50～100 L/10a 少量散布 5～50 L/10a				
		多年生雑草							
とうもろこし		一年生及び多年生雑草	とうもろこし 出芽前まで (雑草生育期)	200～500 mL/10a				2回以内	
豆類 (種実、ただし、だいず、あずき、いんげんまめ、らっかせいを除く)		耕起前又はは種前まで (雑草生育期)							
あずき いんげんまめ			収穫5日前まで (雑草生育期： 畦間処理)						
だいず	—	一年生雑草	耕起前又はは出芽前まで (雑草生育期)	200～500 mL/10a	通常散布 50～100 L/10a 少量散布 5～50 L/10a			雑草 茎葉散布	4回以内
			収穫前日まで (雑草生育期： 畦間処理)		通常散布 50～100 L/10a 少量散布 25～50 L/10a				
			落葉終期～ 収穫14日前まで (雑草生育期)	500mL/10a	50～100 L/10a	1回			
えだまめ			耕起前又はは出芽前まで (雑草生育期)	200～500 mL/10a	通常散布 50～100 L/10a 少量散布 5～50 L/10a				3回以内
			収穫前日まで (雑草生育期： 畦間処理)		通常散布 50～100 L/10a 少量散布 25～50 L/10a				

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	グリホサートを含む農薬の総使用回数
				薬量	希釈水量			
野菜類 (えだまめ、はくさい、キャベツ、アスパラガス、レタス、ねぎ、たまねぎ、にんにく、ほうれんそう、にんじん、だいこん、トマト、ピーマン、とうがらし類、きゅうり、なす、びわ(葉)、リーフ(葉)、しゃくやく(薬用)、たらんぎ、薬用にんじんを除く)	—	一年生雑草	耕起前まで (雑草生育期)	200～500 mL/10a	通常散布 50～100 L/10a 少量散布 5～50 L/10a	1回	雑草 茎葉散布	1回
はくさい キャベツ			耕起前又は 定植5日前まで (雑草生育期)		通常散布 50～100 L/10a 少量散布 25～50 L/10a			
レタス			収穫30日前まで (雑草生育期： 定植後畦間処理)			通常散布 50～100 L/10a 少量散布 5～50 L/10a		
ねぎ			耕起5日前まで (雑草生育期)	通常散布 50～100 L/10a 少量散布 25～50 L/10a	3回以内			
たまねぎ (春播栽培)			収穫7日前まで (雑草生育期： 畦間処理)			通常散布 50～100 L/10a 少量散布 25～50 L/10a		
			スギナ	耕起又は 定植14日前まで (スギナ生育期)	1500～ 2000mL/10a			通常散布 50～100 L/10a 少量散布 5～50 L/10a
たまねぎ (秋播栽培)			一年生雑草	耕起5日前まで (雑草生育期)	200～500 mL/10a	通常散布 50～100 L/10a 少量散布 25～50 L/10a		
				収穫7日前まで (雑草生育期： 畦間処理)		通常散布 50～100 L/10a 少量散布 25～50 L/10a		

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	グリホサートを含む農薬の総使用回数		
				薬量	希釈水量					
にんにく	—	一年生雑草	耕起前まで (雑草生育期)	200～500 mL/10a	通常散布 50～100 L/10a 少量散布 5～50 L/10a	1回	雑草茎葉 散布	1回		
			収穫前日まで (雑草生育期： 畦間処理)		通常散布 50～100 L/10a 少量散布 25～50 L/10a					
ほうれんそう			耕起前又は は種前まで (雑草生育期)		通常散布 50～100 L/10a 少量散布	3回以内			3回以内	
にんじん			通常散布 50～100 L/10a 少量散布		2回以内	2回以内				
アスパラガス		スギナ	耕起前まで (雑草生育期)	1500～ 2000mL/10a	通常散布 50～100 L/10a 少量散布 5～50 L/10a	1回		3回以内		
			収穫前日まで (雑草生育期： 畦間処理)		通常散布 50～100 L/10a 少量散布 25～50 L/10a					
だいこん		—	一年生雑草	耕起前又は は種前まで (雑草生育期)	200～500 mL/10a	通常散布 50～100 L/10a 少量散布 5～50 L/10a		2回以内	2回以内	
				収穫5日前まで (雑草生育期： 畦間処理)		通常散布 50～100 L/10a 少量散布 25～50 L/10a				
薬用 にんじん				耕起前まで (雑草生育期)		通常散布 50～100 L/10a 少量散布 5～50 L/10a		1回		10回以内 (1年間に 2回以内)
トマト しゃくやく (薬用) たらんき				通常散布 50～100 L/10a 少量散布 5～50 L/10a		3回以内				
きゅうり なす	耕起前まで (雑草生育期)		200～500 mL/10a	通常散布 50～100 L/10a 少量散布 25～50 L/10a						
	収穫前日まで (雑草生育期： 畦間処理)			通常散布 50～100 L/10a 少量散布 5～50 L/10a						
ピーマン とうがらし類	一年生雑草		耕起前まで (雑草生育期)	200～500 mL/10a	通常散布 50～100 L/10a 少量散布 5～50 L/10a	2回以内	2回以内			
			収穫前日まで (雑草生育期： 畦間処理)		通常散布 50～100 L/10a 少量散布 25～50 L/10a					

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	グリホサートを含む農薬の総使用回数						
				薬量	希釈水量									
いも類 (かんしょを除く)	—	一年生雑草	耕起前又は 植付前まで (雑草生育期)	200～500 mL/10a	通常散布 50～100 L/10a 少量散布 25～50 L/10a	1回	雑草茎葉 散布	1回						
かんしょ			耕起前又は 挿苗前まで (雑草生育期)			2回以内		2回以内						
			収穫60日前まで (雑草生育期： 畦間処理)											
茶		一年生及び 多年生雑草	摘採7日前まで (雑草生育期)	500～1000 mL/10a		4回以内		2回以内	6回以内					
さとうきび		一年生雑草	耕起前又は 植付前まで (雑草生育期)											
		多年生雑草	収穫60日前まで (雑草生育期： 畦間処理) (但し、 仮茎長1.5m以上)											
		一年生及び 多年生雑草												
		圃場内の 周縁部	一年生雑草	収穫60日前まで (雑草生育期)		200～500 mL/10a								
多年生雑草			500～1000 mL/10a											
飼料用とうも ろこし		—	一年生及び 多年生雑草	飼料用とうもろこし 出芽前まで (雑草生育期)		200～500 mL/10a		通常散布 50～100 L/10a 少量散布 25～50 L/10a	2回以内	雑草茎葉 散布	2回以内			
花き類・ 観葉植物 (きくを除く)	一年生雑草		耕起前まで (雑草生育期)											
きく			雑草生育期 畦間処理											
樹木類	多年生雑草		雑草生育期	500～1000 mL/10a	4回以内		4回以内							
	スギナ			1500～2000 mL/10a										
	マルバツユ クサ			500～1500 mL/10a										
	一年生雑草			200～500 mL/10a										
樹木等	公園 堤とう 駐車場 道路 運動場 宅地 のり面 鉄道等		多年生雑草	雑草生育期	500～1000 mL/10a		少量散布 5～25 L/10a					3回以内	植栽地を 除く樹木 等の周辺 地に雑草 木茎葉散 布	3回以内
			一年生及び 多年生雑草											
			スギナ											
		スギ ヒレハツ クサ等のつる 性 多年生雑草 ササ類 雑かん木	1000～2000 mL/10a											
		一年生及び 多年生雑草	200～500 mL/10a											
牧草	牧野、草地 (更新・ 造成)	一年生及び 多年生雑草	耕起前まで (雑草生育期)	200～500 mL/10a	少量散布 25～50 L/10a	3回以内	雑草茎葉 散布	3回以内						
			耕起整地後～ は種当日まで (雑草発生揃期)											
		多年生 イネ科雑草	最終刈取後： 雑草生育期	500～1000 mL/10a	50～100 L/10a									

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	グリホサートを含む農薬の総使用回数
				薬量	希釈水量			
ソルガム	—	一年生雑草	耕起前又はは種前まで	200～500 mL/10a	通常散布 50～100 L/10a 少量散布 25～50 L/10a	2回以内	雑草茎葉 散布	2回以内
桑		一年生及び 多年生雑草	発芽前又は 夏切後発芽前 (雑草生育期)		少量散布 25～50 L/10a			4回以内
林木	林地 造林地 (地ごしらえ)	ススキ、ササ類、 クサ等の 多年生雑草、 雑かん木	生育期	1000～2000 mL/10a	30L/10a	3回以内	雑草木 茎葉散布	3回以内
まつ (下刈り)	25L/10a							
飼料用 さとうきび	—	一年生雑草	耕起前又は 植付前まで (雑草生育期)	200～500 mL/10a	通常散布 50～100 L/10a 少量散布 25～50 L/10a	4回以内	雑草茎葉 散布	4回以内
		多年生雑草		500～1000 mL/10a				



注入処理

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	希釈倍数	使用液量	本剤の使用回数	使用方法	グリホサートを含む農薬の総使用回数
樹木等	公園 堤とう 駐車場 道路 運動場 宅地 のり面 鉄道等	クズ	生育期	原液	1~2mL/株	-	株頭注入処理	-
		雑かん木	雑かん木 生育期	原液 又は 2倍液	1mL/カ所 幹周7~8cm間隔 <u>地上30cm直径</u> <u>カ所数</u> 10cm以下        2~3 10~15cm        4~6 16~20cm        7~9 20cm以上        10以上		立木注入処理	
		クズ・フジ等のつる類	生育期		<u>つる径</u> <u>使用量(mL/株)</u> 2.0cm以下        0.5 2.1~3.0cm        1.0 3.1~4.0cm        1.5 4.1~5.0cm        2.0 5.1cm以上        3.0以上		つる注入処理	
林木	林地	雑かん木、間伐するすぎ、ひのき	雑かん木、間伐するすぎ、ひのき 生育期		原液	1mL/カ所 幹周7~8cm間隔 <u>地上30cm直径</u> <u>カ所数</u> 10cm以下        2~3 10~15cm        4~6 16~20cm        7~9 20cm以上        10以上	-	立木注入処理
		アカギ	アカギ 生育期	1mL/カ所 幹周7~8cm間隔 <u>地上30cm直径</u> <u>カ所数</u> 10cm以下        2~3 10~20cm        4~8 20cm以上        10以上				
		林地 放置竹林 畑地	竹類	夏~秋 期		原液		5~10mL/本
畑作物	畑地	アカギ	アカギ 生育期	原液	1mL/カ所 幹周7~8cm間隔 <u>地上30cm直径</u> <u>カ所数</u> 10cm以下        2~3 10~20cm        4~8 20cm以上        10以上	-	立木注入処理	-

塗布処理

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	希釈 倍数	使用液量	本剤の 使用回数	使用方法	グリホサート を含む 農薬の総 使用回数	
樹木等	公園 堤とう 駐車場 道路 運動場 宅地 のり面 鉄道等	雑かん木	伐採直後	原液 又は 2倍液	切り口全体に 十分量を塗布	—	植栽地を 除く樹木 等の周辺 地に切株 塗布処理	—	
樹木類	林地、 畑地			原液	<u>切り口直径</u> 5cm以下	<u>塗布量</u> 2mL	4回以内	切株塗布 処理	4回以内
牧草	牧野、 草地				5～10cm 10cm以上	3～6mL 10mL以上	2回以内		3回以内
日本芝 (のしば)	—	一年生及び 多年生雑草	雑草生育期	5～10 倍	3～9L/10a	3回以内	雑草茎葉 塗布	3回以内	