

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	グリホサートを含む農薬の総使用回数
				薬量	希釈水量			
果樹類 (かんきつを除く)	—	一年生雑草	—	200～500 ml/10a	通常散布 50～100 L/10a 少量散布 25～50 L/10a	3回以内	—	3回以内
		多年生雑草		500～1000 ml/10a				
		スギナ		1500～2000 ml/10a				
		マルバツユクサ		500～1500 ml/10a				
かんきつ	—	一年生雑草	収穫7日前まで (雑草生育期)	200～1000 ml/10a	通常散布 50～100 L/10a 少量散布 5～50 L/10a	5回以内	—	5回以内
		多年生雑草		500～1000 ml/10a				
		スギナ		1500～2000 ml/10a				
		マルバツユクサ		500～1500 ml/10a				
びわ(葉)	—	一年生雑草	耕起前まで (雑草生育期)	200～500 ml/10a	通常散布 50～100 L/10a 少量散布 5～50 L/10a	1回	雑草 茎葉散布	3回以内
		多年生雑草		500～1000 ml/10a				
		スギナ	収穫7日前まで (雑草生育期)	1500～2000 ml/10a	通常散布 50～100 L/10a 少量散布 25～50 L/10a	3回以内		
		マルバツユクサ		500～1500 ml/10a				
オリーブ (葉)	—	一年生雑草	耕起前まで (雑草生育期)	200～500 ml/10a	通常散布 50～100 L/10a 少量散布 5～50 L/10a	1回	—	3回以内
		多年生雑草		500～1000 ml/10a				
		スギナ	収穫21日前まで (雑草生育期)	1500 ml/10a	通常散布 50～100 L/10a 少量散布 25～50 L/10a	3回以内		
		マルバツユクサ		500～1500 ml/10a				

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	グリホサートを含む農薬の総使用回数
				薬量	希釈水量			
水田作物 (水田畦畔)	水田畦畔	一年生及び 多年生雑草	収穫前日まで (雑草生育期)	200～1000 mL/10a	少量散布 5～25 L/10a	3回以内		3回以内
		一年生雑草		200～500 mL/10a	通常散布 50～100 L/10a			
		多年生雑草		200～1000 mL/10a	少量散布			
		スギナ		1500～2000 mL/10a	25～50 L/10a			
水田作物 (水田刈跡)	水田刈跡	一年生雑草		200～500 mL/10a	通常散布 50～100 L/10a	1回		1回
		多年生雑草		500～1000 mL/10a	少量散布			
水田作物、 畑作物 (休耕田)	休耕田	一年生雑草	雑草生育期	200～500 mL/10a	少量散布 5～50 L/10a	3回以内	雑草 茎葉散布	3回以内
		多年生雑草		500～1000 mL/10a	通常散布 50～100 L/10a			
		スギナ		1500～2000 mL/10a	少量散布 25～50 L/10a			
水田作物 (水稲を除く) 移植水稲	—	一年生雑草及び 多年生広葉雑草	耕起前 (雑草生育期)	200～500 mL/10a	通常散布 50～100 L/10a 少量散布 5～50 L/10a	2回以内		2回以内
		多年生イネ科 雑草		500 mL/10a	少量散布 5～25 L/10a			
				200～500 mL/10a	通常散布 50～100 L/10a 少量散布 25～50 L/10a			

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	グリホサートを含む農薬の総使用回数
				薬量	希釈水量			
直播水稻	—	一年生雑草及び 多年生広葉雑草	耕起前 (雑草生育期)	200～500 mL/10a	通常散布 50～100 L/10a 少量散布 5～50 L/10a	2回以内	雑草 茎葉散布	2回以内
		多年生イネ科 雑草			500 mL/10a			
		一年生及び 多年生雑草	耕起直後～出芽前 (雑草生育期) (乾田耕起栽培)	200～500 mL/10a	少量散布 25～50 L/10a			
		一年生雑草	は種30日前～ 出芽前 (雑草生育期) (乾田不耕起栽培)		通常散布 50～100 L/10a 少量散布 5～50 L/10a			
		多年生雑草			少量散布 5～50 L/10a			

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	グリホサートを含む農薬の総使用回数
				薬量	希釈水量			
麦類	—	一年生雑草	耕起前又はは種前まで (雑草生育期)	200～500 mL/10a	少量散布 5～25 L/10a	3回以内	雑草 茎葉散布	3回以内
			は種後出芽前 (雑草生育期)		通常散布 50～100 L/10a 少量散布 25～50 L/10a			
		一年生雑草及び 多年生イネ科雑草	耕起前又はは種前まで (雑草生育期)		通常散布 50～100 L/10a 少量散布 5～50 L/10a			
	圃場内の 周縁部	一年生雑草	収穫前日まで (雑草生育期)					
雑穀類 (そば、とうもろこしを 除く)	—	一年生及び 多年生雑草	耕起前又はは種前まで (雑草生育期)	200～500 mL/10a	通常散布 50～100 L/10a 少量散布 25～50 L/10a	2回以内	雑草 茎葉散布	2回以内
そば			とうもろこし 出芽前まで (雑草生育期)					
とうもろこし	一年生及び 多年生雑草	とうもろこし 出芽前まで (雑草生育期)						
豆類 (種実、ただし、だいず、 あずき、いんげんまめ、 らっかせいを除く)	—	一年生雑草	耕起前又はは種前まで (雑草生育期)					
あずき いんげんまめ			収穫5日前まで (雑草生育期： 畦間処理)					
だいず			耕起前又はは種前まで (雑草生育期)	通常散布 50～100 L/10a 少量散布 25～50 L/10a				
だいず	—	一年生雑草	収穫前日まで (雑草生育期： 畦間処理)	通常散布 50～100 L/10a 少量散布 25～50 L/10a				
だいず	—	一年生雑草	落葉終期～ 収穫14日前まで (雑草生育期)	500mL/10a	50～100 L/10a	1回	雑草 茎葉散布	4回以内

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	グリホサートを含む農薬の総使用回数				
				薬量	希釈水量							
えだまめ			耕起前又は出芽前まで (雑草生育期)		通常散布 50～100 L/10a 少量散布 5～50 L/10a	3回以内		3回以内				
			収穫前日まで (雑草生育期： 畦間処理)		通常散布 50～100 L/10a 少量散布 25～50 L/10a				2回以内			
野菜類 (えだまめ、はくさい、 キャベツ、アスパラガス、 レタス、ねぎ、たまねぎ、 にんにく、ほうれんそう、 にんじん、だいこん、 トマト、ピーマン、とうがらし類、 きゅうり、なす、びわ(葉)、 カリブ(葉)、たらきのき、 薬用 にんじん、いも類、 豆類(種実)を除く)	-	一年生雑草	耕起前まで (雑草生育期)	200～500 mL/10a	通常散布 50～100 L/10a 少量散布 5～50 L/10a	1回		1回				
			はくさい キャベツ		耕起前又は定植5日前まで (雑草生育期)				通常散布 50～100 L/10a 少量散布 25～50 L/10a	3回以内		3回以内
			レタス		収穫30日前まで (雑草生育期： 定植後畦間処理)							
			ねぎ		耕起5日前まで (雑草生育期)							
たまねぎ (春播栽培)			収穫7日前まで (雑草生育期： 畦間処理)	1500～ 2000mL/10a	通常散布 50～100 L/10a 少量散布 25～50 L/10a	3回以内		3回以内				
			スギナ		耕起又は定植14日前まで (スギナ生育期)							
たまねぎ (秋播栽培)		一年生雑草	耕起5日前まで (雑草生育期)	200～500 mL/10a	通常散布 50～100 L/10a 少量散布 5～50 L/10a	3回以内						
			収穫7日前まで (雑草生育期： 畦間処理)		通常散布 50～100 L/10a 少量散布 25～50 L/10a							

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	グリホサートを含む農薬の総使用回数		
				薬量	希釈水量					
にんにく	—	一年生雑草	耕起前まで (雑草生育期)	200～500 mL/10a	通常散布 50～100 L/10a 少量散布 5～50 L/10a	1回	雑草茎葉 散布	1回		
			収穫前日まで (雑草生育期： 畦間処理)		通常散布 50～100 L/10a 少量散布 25～50 L/10a					
ほうれんそう			耕起前又は は種前まで (雑草生育期)		通常散布 50～100 L/10a 少量散布	3回以内		3回以内		
にんじん					少量散布 5～50 L/10a	2回以内		2回以内		
アスパラガス			耕起前まで (雑草生育期)		通常散布 50～100 L/10a 少量散布 5～50 L/10a	1回		3回以内		
			収穫前日まで (雑草生育期： 畦間処理)	1500～ 2000mL/10a	通常散布 50～100 L/10a 少量散布 25～50 L/10a					
		スギナ								
だいこん			一年生雑草	耕起前又は は種前まで (雑草生育期)	200～500 mL/10a	通常散布 50～100 L/10a 少量散布 5～50 L/10a		2回以内	雑草茎葉 散布	2回以内
				収穫5日前まで (雑草生育期： 畦間処理)		通常散布 50～100 L/10a 少量散布 25～50 L/10a				
薬用 にんじん		耕起前まで (雑草生育期)				通常散布 50～100 L/10a 少量散布 5～50 L/10a		1回		10回以内 (1年間に 2回以内)
トマト しゃくやく (薬用) たらきの		耕起前まで (雑草生育期)				通常散布 50～100 L/10a 少量散布 5～50 L/10a		2回以内		3回以内
きゅうり なす		収穫前日まで (雑草生育期： 畦間処理)				通常散布 50～100 L/10a 少量散布 25～50 L/10a				
		ピーマン とうがらし類		耕起前まで (雑草生育期)				通常散布 50～100 L/10a 少量散布 5～50 L/10a		2回以内
				収穫前日まで (雑草生育期： 畦間処理)				通常散布 50～100 L/10a 少量散布 25～50 L/10a		

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	グリホサートを含む農薬の総使用回数
				薬量	希釈水量			
いも類 (かんしょを除く)	—	一年生雑草	耕起前又は植付前まで (雑草生育期)	200～500 mL/10a	通常散布 50～100 L/10a 少量散布 25～50 L/10a	1回	雑草茎葉 散布	1回
かんしょ			耕起前又は挿苗前まで (雑草生育期)			2回以内		2回以内
茶		一年生及び多年生雑草	摘採7日前まで (雑草生育期)	4回以内				
さとうきび		一年生雑草	耕起前又は植付前まで (雑草生育期)			500～1000 mL/10a		2回以内
		多年生雑草	収穫60日前まで (雑草生育期： 畦間処理) (但し、 仮茎長1.5m以上)					
		圃場内の 周縁部	一年生雑草	収穫60日前まで (雑草生育期)		200～500 mL/10a		
			多年生雑草	500～1000 mL/10a				

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	グリホサートを含む農薬の総使用回数
				薬量	希釈水量			
飼料用とうもろこし	—	一年生及び多年生雑草	飼料用とうもろこし出芽前まで(雑草生育期)	200～500 mL/10a	通常散布 50～100 L/10a 少量散布 5～50 L/10a	2回以内	雑草茎葉散布	2回以内
花き類・観葉植物(きくを除く)		一年生雑草	耕起前まで(雑草生育期)		通常散布 50～100 L/10a 少量散布 25～50 L/10a			
きく		雑草生育期 畦間処理						
樹木類	—	一年生雑草	雑草生育期	200～500 mL/10a	通常散布 50～100 L/10a 少量散布 5～50 L/10a	4回以内		4回以内
		多年生雑草		500～1000 mL/10a	通常散布 50～100 L/10a 少量散布 5～50 L/10a			
		スギナ		1500～2000 mL/10a	通常散布 50～100 L/10a 少量散布 25～50 L/10a			
		マルバツユクサ		500～1500 mL/10a	通常散布 50～100 L/10a 少量散布 25～50 L/10a			
樹木等	公園 堤とう 駐車場 道路 運動場 宅地 のり面 鉄道等	一年生雑草	雑草生育期	200～500 mL/10a	通常散布 50～100 L/10a 少量散布 25～50 L/10a	3回以内	植栽地を 除く樹木 等の周辺 地に雑草 木茎葉散 布	3回以内
		多年生雑草		500～1000 mL/10a	少量散布 5～25 L/10a			
		一年生及び多年生雑草		500～1000 mL/10a	少量散布 5～25 L/10a			
		スギナ		1500～2000 mL/10a	通常散布 50～100 L/10a 少量散布 25～50 L/10a			
		ススキ ヒレハソウ クス等のつる性 多年生雑草 ササ類 雑かん木		1000～2000 mL/10a	少量散布 25～50 L/10a			
牧草	牧野、草地 (更新・造成)	一年生及び多年生雑草	耕起前まで(雑草生育期)	200～500 mL/10a	少量散布 25～50 L/10a	3回以内	雑草茎葉 散布	3回以内
			耕起整地後～は種当日まで(雑草発生揃期)		少量散布 5～50 L/10a			
		多年生イネ科雑草	最終刈取後：雑草生育期	500～1000 mL/10a	50～100 L/10a			
ソルガム	—	一年生雑草	耕起前又はは種前まで	200～500 mL/10a	通常散布 50～100 L/10a 少量散布 25～50 L/10a	2回以内		2回以内
桑	一年生及び多年生雑草	発芽前又は夏切後発芽前(雑草生育期)	少量散布 25～50 L/10a		4回以内	4回以内		
林木	林地 造林地 (地ごしらえ)	ススキ、ササ類、 クス等の 多年生雑草、 雑かん木	生育期	1000～2000 mL/10a	30L/10a	3回以内	雑草木 茎葉散布	3回以内
まつ (下刈り)	25L/10a							
飼料用 さとうきび	—	一年生雑草	耕起前又は 植付前まで (雑草生育期)	200～500 mL/10a	通常散布 50～100 L/10a 少量散布 25～50 L/10a	4回以内	雑草茎葉 散布	4回以内
		多年生雑草		500～1000 mL/10a	少量散布 25～50 L/10a			

注入処理

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	希釈倍数	使用液量	本剤の使用回数	使用方法	グリホサートを含む農薬の総使用回数
樹木等	公園 堤とう 駐車場 道路 運動場 宅地 のり面 鉄道等	クズ	生育期	原液	1~2mL/株	-	株頭注入処理	-
		雑かん木	雑かん木 生育期	原液 又は 2倍液	1mL/カ所 幹周7~8cm間隔		立木注入処理	
		クズ・フジ 等のつる 類	生育期		地上30cm直径		カ所数	
林木	林地	雑かん木、 間伐する すぎ、ひの き	雑かん 木、間伐 するす ぎ、ひの き 生育期		2.0cm以下	0.5	-	立木注入処理
				2.1~3.0cm	1.0			
				3.1~4.0cm	1.5			
				4.1~5.0cm	2.0			
畑作物	畑地	アカギ	アカギ 生育期	原液	5~10mL/本	-	竹稈注入処理	-
					1mL/カ所 幹周7~8cm間隔		立木注入処理	
					地上30cm直径		カ所数	
10cm以下	2~3	10~20cm	4~8	20cm以上	10以上			

塗布処理

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	希釈 倍数	使用液量	本剤の 使用回数	使用方法	グリホサート を含む 農薬の総 使用回数
樹木等	公園 堤とう 駐車場 道路 運動場 宅地 のり面 鉄道等	雑かん木	伐採直後	原液 又は 2倍液	切り口全体に 十分量を塗布	—	植栽地を 除く樹木 等の周辺 地に切株 塗布処理	—
樹木類	林地、 畑地			原液	<u>切り口直径</u> <u>塗布量</u> 5cm以下 2mL	4回以内	切株塗布 処理	4回以内
牧草	牧野、 草地				5～10cm 3～6mL 10cm以上 10mL以上	2回以内		3回以内
日本芝 (のしば)	—			一年生及び 多年生雑草	雑草生育期	5～10倍	3～9L/10a	3回以内