

メーカー別推奨機種一覧 ラウンドノズル®ULV5ブームスプレーヤ用編

※この一覧表にない機種は作動確認を行っておりませんので、各農機メーカーにお問合せください。(2022年10月現在)

メーカー名	推奨機種
丸山製作所	BSM201/301/500S/500F シリーズ
	BSM640-12m/640-14m シリーズ
	BSM840/1065/1365/1665-16m シリーズ
	BSM1070/1270/1670-16m シリーズ
	BSM1070/1270/1670-18m シリーズ
	BSM1175/1375/1675 シリーズ
	BSA500/500J/501/501J シリーズ
	BSA500L/501L/650L/651L/950L/951L シリーズ*
	BSA650C/651C/950C/951C シリーズ*
	BSA662C/1062C シリーズ
*Gタイプ(肥料散布装置付き)は装着不可(伸縮時、接触有り)	
クボタ	クボタ KBM シリーズ
共立 (やまびこ)	RVH(C)650系/900系
	RVH600系/500系/50系
	RV(H)60系
	BSM500L系の一部
井関農機	JKB23
	JKZ23

あなたの除草コスト、いくら削減？

ラウンドアップと専用ノズルULV5を使用した場合と慣行の比較ができます。

除草コストシミュレーター！



スマホから
すぐ出来る！



ラウンドアップ
ホームページ
WEB



ラウンドアップ[®]マックスロードによる 希釈水量5ℓ～/10aの登録抜粋

2021年12月現在

※少量散布(5ℓ～/10a)は専用のラウンドノズルULV5を用いて散布してください。



作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	10アール当り使用量		本剤の使用回数	使用方法	グリホサートを含む農薬の総使用回数
				薬量(mℓ)	希釈水量(ℓ)			
かんきつ	—	一年生雑草	収穫7日前まで (雑草生育期)	200~1000	通常散布50~100 少量散布5~50	5回以内	—	5回以内
		多年生雑草		500~1000				
びわ(葉)	—	一年生雑草	耕起前まで (雑草生育期)	200~500	通常散布50~100 少量散布5~50	1回	—	3回以内
オリーブ(葉)		—	—					
水田作物 (水田畦畔)	水田畦畔	一年生及び 多年生雑草	収穫前日まで (雑草生育期)	200~1000	少量散布5~25	3回以内	—	—
水田作物 (水田刈跡)	水田刈跡	一年生雑草	雑草生育期	200~500	通常散布50~100 少量散布5~50	1回	—	1回
		多年生雑草		500~1000				
水田作物、 畑作物(休耕田)	休耕田	一年生雑草	—	200~500	通常散布50~100 少量散布5~50	3回以内	—	3回以内
		多年生雑草		500~1000				
水田作物 (水稲を除く) 移植水稲	—	一年生雑草及び 多年生広葉雑草	耕起前 (雑草生育期)	200~500	通常散布50~100 少量散布5~50	2回以内	—	2回以内
		多年生イネ科雑草		500				
直播水稲	—	一年生雑草及び 多年生広葉雑草	—	200~500	通常散布50~100 少量散布5~50	2回以内	—	2回以内
		多年生イネ科雑草		500				
飼料用 とうもろこし	—	一年生雑草	は種30日前~出芽前 (雑草生育期) (乾田不耕起栽培)	200~500	通常散布50~100 少量散布5~50	4回以内	—	4回以内
		多年生雑草						
樹木類	—	一年生及び 多年生雑草	飼料用とうもろこし 出芽前まで(雑草生育期)	200~500	通常散布50~100 少量散布5~50	4回以内	—	4回以内
		—						
牧草	牧野、草地 (更新・造成)	一年生及び 多年生雑草	耕起整地後~は種当日まで (雑草発生揃期)	200~500	少量散布5~50	3回以内	—	3回以内
麦類	—	一年生雑草	耕起前又はは種前まで (雑草生育期)	200~500	通常散布50~100 少量散布5~50	3回以内	—	3回以内
	圃場内の 周縁部		は種後出芽前 (雑草生育期)					
そば		—	一年生雑草	取穫前日まで (雑草生育期)	200~500	通常散布50~100 少量散布5~50	雑草茎葉 散布	2回以内
だいず	耕起前又はは種前まで (雑草生育期)			2回以内				
えだまめ	—	一年生雑草	耕起前又は出芽前まで (雑草生育期)	200~500	通常散布50~100 少量散布5~50	3回以内	雑草茎葉 散布	3回以内
野菜類 (えだまめ、はくさい、キャベツ、ア スパラガス、レタス、ねぎ、たまねぎ、 にんにく、ほうれんそう、にんじん、 だいこん、トマト、ピーマン、とうが らし類、きゅうり、なす、ひわ(葉)、 オリーブ(葉)、たらのぎ、薬用にん じん、いも類、豆類(種実)を除く)			耕起前まで (雑草生育期)					1回
はくさい	—	一年生雑草	耕起前又は 定植5日前まで (雑草生育期)	200~500	通常散布50~100 少量散布5~50	3回以内	雑草茎葉 散布	3回以内
キャベツ			—					—
レタス	—	一年生雑草	耕起5日前まで (雑草生育期)	200~500	通常散布50~100 少量散布5~50	3回以内	雑草茎葉 散布	3回以内
ねぎ			—					—
たまねぎ (春播栽培)	—	一年生雑草	耕起前まで(雑草生育期)	200~500	通常散布50~100 少量散布5~50	1回	雑草茎葉 散布	1回
たまねぎ (秋播栽培)			—					—
にんにく	—	一年生雑草	耕起前又はは種前まで (雑草生育期)	200~500	通常散布50~100 少量散布5~50	3回以内	雑草茎葉 散布	3回以内
ほうれんそう			—					—
にんじん	—	一年生雑草	耕起前又はは種前まで (雑草生育期)	200~500	通常散布50~100 少量散布5~50	2回以内	雑草茎葉 散布	2回以内
アスパラガス			—					—
だいこん	—	一年生雑草	耕起前まで(雑草生育期)	200~500	通常散布50~100 少量散布5~50	1回	雑草茎葉 散布	3回以内
薬用にんじん			—					—
トマト	—	一年生雑草	耕起前又はは種前まで (雑草生育期)	200~500	通常散布50~100 少量散布5~50	2回以内	雑草茎葉 散布	2回以内
しゃくやく(薬用) たらのぎ			—					—
きゅうり	—	一年生雑草	耕起前まで(雑草生育期)	200~500	通常散布50~100 少量散布5~50	1回	雑草茎葉 散布	10回以内 (1年間に2回以内)
なす			—					—
ピーマン	—	一年生及び 多年生雑草	耕起前又はは種前まで (雑草生育期)	200~500	通常散布50~100 少量散布5~50	1回	雑草茎葉 散布	3回以内
とうがらし類			—					—
樹木等	公園、堤とう、 駐車場、道路、 運動場、宅地、 のり面、鉄道等	一年生及び 多年生雑草	雑草生育期	500~1000	少量散布5~25	3回以内	植栽地を 除く樹木等の 周辺地に雑草 木茎葉散布	3回以内

5ℓ少量散布の適用作物など

最新の内容はWEBからご覧頂けます

ラウンドアップ

検索



日産化学株式会社

〒103-6119 東京都中央区日本橋二丁目5番1号

©ラウンドアップお客様相談窓口(平日9:00~17:00) ☎ 0120-209374