


確かな効果はそのままに、 わずか水5ℓ/10aの 少水量散布を実現！

ラウンドアップ®
マックスロード



ラウンドアップ®マックスロード
農林水産省登録 第 21766 号 有効成分 グリホサートカリウム塩 48.0%

ラウンドノズル®ULV5は、10アールあたり
[水5ℓに薬量500ml]*が基本です。

基本

希釈水量5ℓ~/10a
薬量500ml*/10a

*作物名、適用場所等により異なります。薬量200~1,000ml/10a ※ご使用前に除草剤ラウンドアップ®マックスロード製品ラベルをご確認ください。

希釈水量5ℓ~/10aの登録抜粋

2021年12月現在 ※少量散布(5ℓ~/10a)は専用のラウンドノズルULV5を用いて散布してください。

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	10アール当り使用量		本剤の使用回数	使用方法	グリホサートを含む農薬の総使用回数
				薬量(ml)	希釈水量(ℓ)			
かんきつ	—	一年生雑草	収穫7日前まで (雑草生育期)	200~1000	通常散布50~100 少量散布5~50	5回以内		5回以内
		多年生雑草		500~1000				
びわ(葉)	—	一年生雑草	耕起前まで (雑草生育期)	200~500		1回		3回以内
オリーブ(葉)								
水田作物 (水田畦畔)	水田畦畔	一年生及び 多年生雑草	収穫前日まで (雑草生育期)	200~1000	少量散布5~25	3回以内		
水田作物 (水田刈跡)	水田刈跡	一年生雑草	雑草生育期	200~500		1回		1回
		多年生雑草		500~1000				
水田作物、 畑作物(休耕田)	休耕田	一年生雑草	雑草生育期	200~500	通常散布50~100 少量散布5~50	3回以内		3回以内
		多年生雑草		500~1000				
水田作物 (水稻を除く) 移植水稻	—	一年生雑草及び 多年生広葉雑草	耕起前 (雑草生育期)	200~500	少量散布5~25	2回以内		2回以内
		多年生イネ科雑草		500				
直播水稻	—	一年生雑草及び 多年生広葉雑草	耕起前 (雑草生育期)	200~500	通常散布50~100 少量散布5~50	2回以内		2回以内
		多年生イネ科雑草		500				
飼料用 とうもろこし	—	一年生及び 多年生雑草	は種30日前~出芽前 (雑草生育期) (乾田不耕起栽培)	200~500	通常散布50~100 少量散布5~50	4回以内		4回以内
		一年生雑草						
樹木類	—	一年生及び 多年生雑草	飼料用とうもろこし 出芽前まで(雑草生育期)	200~500	通常散布50~100 少量散布5~50	4回以内		4回以内
		一年生雑草						
牧草	牧野、草地 (更新・造成)	一年生及び 多年生雑草	耕起整地後~は種当日まで (雑草発生揃期)	200~500	少量散布5~50	3回以内		3回以内
麦類	—	一年生雑草	耕起前又はは種前まで (雑草生育期)	200~500	少量散布5~25	3回以内		3回以内
	圃場内の 周縁部		は種後出芽前 (雑草生育期)					
そば	—	一年生雑草	収穫前日まで (雑草生育期)	200~500	通常散布50~100 少量散布5~50	3回以内		3回以内
だいず			耕起前又はは種前まで (雑草生育期)					
えだまめ	—	一年生雑草	耕起前又はは種前まで (雑草生育期)	200~500	通常散布50~100 少量散布5~50	3回以内		3回以内
野菜類 (えだまめ、はくさい、キャベツ、 アスパラガス、レタス、ねぎ、たまねぎ、 にんにく、ほうれんそう、にんじん、 だいこん、トマト、ピーマン、とうが らし、きゅうり、なす、びわ(葉)、 オリーブ(葉)、たらのぎ、薬用にしん、 いも、黒豆(雑穀)を除く)			耕起前まで (雑草生育期)					
はくさい	—	一年生雑草	耕起前又はは種前まで (雑草生育期)	200~500	通常散布50~100 少量散布5~50	3回以内		3回以内
キャベツ			耕起前又は 定植5日前まで (雑草生育期)					
レタス	—	一年生雑草	耕起5日前まで (雑草生育期)	200~500	通常散布50~100 少量散布5~50	3回以内		3回以内
ねぎ			耕起前まで(雑草生育期)					
たまねぎ (春播栽培)	—	一年生雑草	耕起前又はは種前まで (雑草生育期)	200~500	通常散布50~100 少量散布5~50	3回以内		3回以内
たまねぎ (秋播栽培)			耕起前まで(雑草生育期)					
にんにく	—	一年生雑草	耕起前又はは種前まで (雑草生育期)	200~500	通常散布50~100 少量散布5~50	3回以内		3回以内
ほうれんそう			耕起前又はは種前まで (雑草生育期)					
にんじん	—	一年生雑草	耕起前又はは種前まで (雑草生育期)	200~500	通常散布50~100 少量散布5~50	3回以内		3回以内
アスパラガス			耕起前又はは種前まで (雑草生育期)					
だいこん	—	一年生雑草	耕起前又はは種前まで (雑草生育期)	200~500	通常散布50~100 少量散布5~50	3回以内		3回以内
薬用にしん			耕起前又はは種前まで (雑草生育期)					
トマト しゃくやく(薬用) たらのぎ	—	一年生雑草	耕起前又はは種前まで (雑草生育期)	200~500	通常散布50~100 少量散布5~50	3回以内		3回以内
きゅうり なす			耕起前まで (雑草生育期)					
ピーマン とうがらし類	—	一年生雑草	耕起前又はは種前まで (雑草生育期)	200~500	通常散布50~100 少量散布5~50	3回以内		3回以内
樹木等			公園、堤とう、 駐車場、道路、 運動場、宅地、 のり面、鉄道等					